

Unser Service im Überblick

- Fachkompetente pharmazeutische Beratung
- Beratung zur richtigen Anwendung der verordneten Medikation
- Umfangreiches Medikationsmanagement
- Beratung zu möglichen Therapieergänzungen
- Bequeme, kostenlose und termingerechte Lieferung an Ihre Wunschadresse
- Bestellen Sie sich Ihre Medikamente zur Abholung an einen unserer 4 Standorte in Berlin, in unserer 24-Uhr-Apotheke, täglich 8-24 Uhr

Wir sind von Montag bis Freitag von 8 – 17 Uhr für Sie da!
Vor Ort, telefonisch oder per Mail. Wir nehmen uns die Zeit, Sie persönlich und individuell zu beraten.



Sabrina Büllau Sarah Junghans Susanne Knappe Luisa Scholz Anna-Lena Schultz

MediosApotheke an der Charité

FachApotheke Neurologie

Anike Oleski e.Kfr.

Luisenstr. 54/55, 10117 Berlin

T (030) 257 620 583 55, F (030) 257 620 583 13

neurologie@mediosapotheke.de



Anwendungs-
hinweise

Neuropathische Schmerzen

Hinweise zur topischen
Anwendung des Schmerzgels
mit Amitriptylin, Ketamin und
Lidocain

Anwendungshinweise

Vorbereitung



- Waschen Sie vor und nach dem Auftragen Ihre Hände. Um mögliche Hautirritationen zu verhindern, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten.
- Achten Sie darauf, dass vorhandene Rückstände des Schmerzgels vor dem Auftragen der nächsten Anwendung mit einem weichen Tuch abgenommen werden.

Während der Behandlung



- Während der Behandlung sollten Sie auf einen ausreichenden Sonnenschutz (LSF 50) achten, da Ihre Haut durch die enthaltenen Wirkstoffe lichtempfindlich – photosensibel – wird!
- Der Sonnenschutz kann ca. 30–45 Minuten nach Auftragen des Schmerzgels angewendet werden.

Anwendung



- Bitte tragen Sie das Schmerzgel 2x täglich auf die betroffenen Hautareale auf.
- Für die Behandlung ist es ausreichend, wenn das Gel dünn aufgetragen wird! Ein Einmassieren ist nicht erforderlich.
- Bitte beachten Sie, dass ein ausreichendes Ansprechen auf die Schmerzbehandlung i.d.R. erst nach längerer Anwendung zu erwarten ist.
- Wenden Sie das Gel nicht auf frisch rasierten Hautstellen an.

Lagerung



- Lagern Sie das Gel bei Raumtemperatur (< 25°C). Um zusätzlich einen kühlenden Effekt zu erzielen, können Sie die Tube im Kühlschrank aufbewahren.
- Die Haltbarkeit des Schmerzgels ist auf 4 Wochen begrenzt.



Sie haben Fragen zu Ihrer Medikation?

Wir nehmen uns die Zeit, Sie individuell und persönlich zu beraten. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8–17 Uhr telefonisch unter (030) 257 620 583 55 oder per Email neurologie@mediosapotheke.de oder vor Ort in unserer Apotheke.